



Parent's information sheet for A child with fever

Warning signs which mandates hospital visit and urgent addressal by health care team

1. Age of patient

- a. Less than 4 weeks (may require immediate hospitalization)
- b. 1 to 3 month (These patients need base line lab investigations for consideration of hospitalization)
- c. 3 months and above- if fever (above 37.9°C/100.2°F) is persistent and not responding to oral medications, family history of febrile seizure

2. Frequent spikes of fever for more than 5 days

3. Sick child signs even if fever is not so high. If the child is

- a. Dull looking, not playful
- b. Lethargic
- c. Not interested in surroundings
- d. No proper eye to eye contact
- e. Having difficulty in breathing/ Fast breathing
- f. Dusky discoloration of face, hands and feet
- g. Sunken eyes
- h. Dry lips and mouth
- i. Poor interaction with care givers
- j. Poor feeding

4. Acute events:

- a. Child becomes anxious / restless or listless.
- b. Not aware of surroundings
- c. Abnormal movements of body or altered consciousness
- d. Any change in behavior or eye contact.

5. Loose stools with persistent vomiting and decreased urine output

6. Fast breathing with chest wall retractions, lower chest in-drawing, nasal flaring

7. Crying while passing of urine

8. Presence of rash

9. Swelling anywhere in body/swelling of joints

10. Previous history of:

- a. Recurrent infections
- b. Any immunodeficiency disease
- c. Any chronic illness



बुखार वाले बच्चे के माता-पिता के लिए सूचना पत्र

चेतावनी संकेत जो स्वास्थ्य देखभाल टीम के तत्काल ध्यान में लाना अनिवार्य है

1. रोगी की आयु

- I. 4 सप्ताह (1 माह) से कम (तुरंत अस्पताल में भर्ती करनी पड़ सकती है)
- II. 1 माह से 3 माह - इन रोगियों को बेस लाइन लैब परीक्षण तथा जोखिम कारकों की उपस्थिति के अनुसार भर्ती के लिए विचार की आवश्यकता होती है
- III. 3 माह और उससे अधिक - यदि बुखार (37.9°C / 100.2°F) से ऊपर लगातार बना हुआ है और मौखिक दवाओं का असर न हो रहा हो, परिवार के सदस्य को ज्वर के साथ दौरे आते हों

2. बार बार बुखार आना (पाँच दिन से अधिक)

3. बच्चा बीमार दिखाई देने के लक्षण (यदि बुखार अधिक न भी हो)

- I. साँस लेने में कठिनाई / तेज़ साँस लेना
- II. सुस्त दिखने वाला चेहरा
- III. चेहरे और हाथ - पैर का नीला दिखना
- IV. आसपास के प्रति रुचि नहीं है
- V. कोई उचित नेत्र संपर्क नहीं है
- VI. धंसी हुई आंखें
- VII. सूखे होंठ और मुंह
- VIII. बाहरी उत्तेजनाओं को असामान्य प्रतिक्रिया
- IX. बच्चा निष्क्रिय है
- X. भोजन नहीं ले रहा है

4. आकस्मिक घटनाएँ:

- I. बच्चा बेचैन, निष्क्रिय या उदासीन हो जाता है
- II. उसे आसपास का पता नहीं चल पा रहा है
- III. शरीर में असामान्य हलचल या अचेत होना
- IV. व्यवहार या आँखों से संपर्क में कोई बदलाव

5. लगातार उल्टी होना, बार बार ढीला मल का होना और पेशाब का कम होना (6 बार से कम)

6. तेज सांस के साथ पसली चलना, छाती के निचले हिस्से का अंदर धसना, नथुने फूलना

7. पेशाब करने के दौरान रोना

8. शरीर में चकत्ते की उपस्थिति

9. शरीर में कहीं भी सूजन या जोड़ों में सूजन

10. पिछली बीमारियों की उपस्थिति, जैसे

- I. आवर्तक संक्रमण
- II. कोई रोग-प्रतिरोधक बीमारी
- III. कोई जीर्ण बीमारी